


FERTIACTYL® Radical


Pagrindinė augalų biostimuliatoriaus FERTIACTYL paskirtis – stimuliuoti augalų mitybos procesus, nepriklausomai nuo produkto esančio maisto medžiagų kiekio, siekiant pagerinti maisto medžiagų įsisavinimo efektyvumą. Patentuotas augalų biostimuliacinis kompleksas FERTIACTYL padidina mitybinių elementų prieinamumą dirvožemyje, skatina šaknų ir šakniaplaukių augimą, aktyvina fotosintezę. Šaknų ir antžeminės masės sinergija padidina mitybinių elementų įsisavinimą, angliavandenių, sausųjų medžiagų kaupimąsi, padidina atsparumą nepalankiems aplinkos veiksniams (pasiruošimą žiemojimui), užtikrina tolygų augalų vystymąsi, ypač ankstyvuose augalų vystymosi tarpsniuose.



**Efektyviam
Mitybinių elementų
įsisavinimui**




> Poveikis



Atsparumas nepalankiems
aplinkos veiksniams



Geresnis augimas ir
vystymasis



Efektyvesnis mitybinių
elementų įsisavinimas



Stipri šaknų sistema
Greitesnė augalų regeneraciją
po žimos

Padidina mitybinių elementų prieinamumą,
skatina augalų fiziologinį aktyvumą ir jų
atsparumą stresui

FERTIACTYL®
Radical

Aktyvuotos huminės ir fulvo rūgštys

- Padidina maisto medžiagų prieinamumą augalams.
- Paskatina šaknų sistemos vystymąsi.
- Pagerina dirvožemio savybę kaupti drėgmę.
- Pagerina oro ir vandens santykį (režimą) dirvožemyje.
- Suaktyvina mikroorganizmų veiklą.
- Sumažina aliuminio poveikį rūgščiose dirvose.

FERTIACTYL®
Radical

Boras + Manganas

- Boras (B) augaluose reguliuoja ląstelių sienelių pralaidumą, padeda įsisavinti kitus mitybos elementus.
- Intensyvina cukrų kaupimą ir pernešimą į kitas augalo dalis.
- Manganas (Mn) aktyvina fermentus, skatina šaknų sistemos vystymąsi ir antžeminės dalies augimą. Aktyvina fotosintezę.



Zeatinas

- Skatina papildomų šaknų ir šakniaplaukių augimą.
- Prailgina chlorofilo gyvimą ir padidina fotosintezės efektyvumą.
- Padeda augalui pernešti fotosintezės metu pagamintas maisto medžiagas (gliukozę, sacharozę, krakmolą).

Glicino betainas

- Natūralus augalų antistresantas, jis padeda augalui efektyviau naudoti vandens ir energijos atsargas.
- Padeda augalui vystytis net ir esant nepalankioms oro sąlygoms.

Šių mikroelementų panaudojimas rudenį palengvina augalų regeneraciją pavasarį bei mažina ligų, tokių kaip šaknų gumbo, sausojo puvinio, bulvinio raupio, miltligės, javaklupės, miltligės, tinkliškosios dryžligės ir kt. ligų plitimą.

> Tręšimo laiko ir tręšimo normų rekomendacijos

FERTIACTYL Radical		
Augalai	Tręšimo laikas	Tręšimo norma* l/ha
Rapsai	Įsitvirtinimas	2-3
Cukriniai runkeliai, burokai	6-10 lapai	3-4
Sodai	Prieš žydėjimą Vaisių augimas kas 15 dienų	4
Daržininkystė	Šaknų augimas Prieš žydėjimą Vaisių augimas	3

ATSKIEDIMAS

Purškimas: į švarų iki pusės pripildytą purkštuvą įpilkite FERTIACTYL Radical ar FERTIACTYL Starter, pildami maišykite. Maišykite viso purškimo metu. Praskiedžiama 150-500 l vandens/ha. Prieš naudojimą suplakti. Nepurškite, jeigu pašalę. Karštu oru purškite anksti rytą arba vėlai vakare.

Laistymo sistemoms: FERTIACTYL Radical ar FERTIACTYL Starter naudojamas praskiedus vandeniu iki koncentracijos nuo 0,5 iki 1 %. Rekomenduojama skiesti vandeniu, kurio pH didesnis kaip 6,5. Prieš naudojimą suplakti.

SUDERINAMUMAS

FERTIACTYL Radical ir FERTIACTYL Starter suderinamas su dauguma tirpių trąšų ir pesticidų, išskyrus rūgštinius tirpalus, mineralines alyvas ir kalcio nitrātą. Visais atvejais prieš maišant reikia patikrinti suderinamumą. Mūsų atsakomybė apribota tik garantija už produktą, esantį originalioje pakuotėje.

LAIKYMAS

Minimali laikymo temperatūra 0 °C.

* - Tręšimo normos yra rekomendacinės, jos turi būti parenkamos atsižvelgiant į augalų būklę, dirvožemį ir oro sąlygas.

> Poveikis šaknų sistemai



> Kontrolė



> FERTIACTYL

> Mitybinių elementų įsisavinimas, panaudojus FERTIACTYL



> Sudėtis

Skystas augalų biostimuliantas skirtas optimizuoti kokybinį ir kiekybinį derliaus potencialą. Pagamintas iš jūros dumblių ekstrakto, organinių, huminių ir fulvo rūgščių. Europos patento Nr. 1160070

FERTIACTYL Radical

Boras (B) 9,2% 128 g/l
Manganas (Mn) 0,4% 5,6 g/l
Aktyvuotos huminės ir fulvo rūgštys
Glicino betainas
Zeatinas